

## **ALLEGATO 7**

### **IL SISTEMA DELLE COLLINE SETTENTRIONALI**

**All. 7A - Vegetazione e flora**

**All. 7B - Bosco di Severini**

**All. 7C - Bosco di Montevecchio**

## **ALLEGATO 7B**

### **BOSCO DI SEVERINI**

Tipo di vegetazione e flora vascolare	Pag. 2
Alberi e arbusti	Pag. 2
Piante erbacee e camefite	Pag. 2
Funghi	Pag. 3
Fauna	Pag. 3
Mammiferi	Pag. 3
Uccelli	Pag. 3
Rettili	Pag. 3
Anfibi	Pag. 3
Importanza biogeografica	Pag. 4

## **Bosco di Severini**

CATEGORIA: bosco basso-collinare

LOCALITA': dintorni di Fenile, nel bacino del T.Arzilla.

COMUNE: Fano

SUPERFICIE:3,8 ettari

QUOTA: 25 - 75 m

CARTOGRAFIA IGM: F. 110 - IV S.O.

PERIMETRAZIONE: quella dell'area floristica omonima.

PROPRIETA': privata

AMBIENTE: piccolo lembo boschivo sul ripido versante di N.O. di un colle con suolo arenaceo-argilloso.

TIPO DI VEGETAZIONE E FLORA VASCOLARE: Querceto mesofilo di Roverella, d'alto fusto.

**Alberi e arbusti:** Ginepro comune, Pioppo bianco, Carpino nero, Nocciolo, Roverella, Olmo campestre, Vitalba, Alloro, Sorbo comune, Biancospino, Prugnolo, Rosa canina, Rosa di S.Giovanni, Rovo comune, Rovo piccolo, Colutea, Dondolino, Citiso minore, Robinia, Acero campestre, Agrifoglio, Fusaggine, Sanguinello, Corniolo, Laurella, Edera, Orniello, Ligustro, Robbia selvatica, Caprifoglio comune, Caprifoglio etrusco, Ciliegio volpino, Laurotino, Smilace, Asparago selvatico, Pungitopo; specie non autoctona introdotta è il Leccio.

**Piante erbacee e camefite:** tra le specie presenti si ricordano Felce aquilina (*Pteridium aquilinum*), Felce asinina (*Asplenium onopteris*), Fior di cuculo (*Silene flos-cululi*), Anemone trifogliata (*Anemone trifolia*), Anemone fegatella (*Hepatica nobilis*), Dentaria bulbifera (*Cardamine bulbifera*), Cicerchia a foglie larghe (*Lathyrus latifolius*), Cicerchia veneta (*Lathyrus venetus*), Euforbia amigdaloides (*Euphorbia amygdaloides*), Euforbia lattarello (*Euphorbia dulcis*), Viola bianca (*Viola alba* subsp. *dehnhardtii*), Viola silvestre (*Viola reichembachiana*), Girardina silvestre (*Aegopodium podagraria*), Finocchio acquatico comune (*Oenanthe pimpinelloides*), Diapensia (*Sanicula europaea*), Ciclamino

napoletano (*Cyclamen hederifolium*), Ciclamino primaverile (*Cyclamen repandum*), Primula (*Primula acaulis*), Crociata glabra (*Cruciata glabra*), Litospermo rosso e blu (*Lithospermum purpureocaeruleum*), Polmonaria (*Pulmonaria apennina*), Consolida tuberosa (*Symphytum tuberosum* subsp. *angustifolium*), Bugola comune (*Ajuga reptans*), Calaminta dei boschi (*Satureja menthifolia*), Bocca di lupo (*Melittis melissophyllum*), Castagnola (*Scrophularia nodosa*), Succiamele gracile (*Orobanche gracilis*), Imbutini (*Campanula trachelium*), Fiordaliso nerastro (*Centaurea nigrescens*), Erba baccherina (*Inula conyza*), Verga d'oro (*Solidago virgaurea*), Giglio rosso (*Lilium bulbiferum* subsp. *croceum*), Tamaro (*Tamus communis*), Giglio dei morti (*Iris foetidissima*), Erba lucciola (*Luzula forsteri*), Brachipodio di selva (*Brachypodium sylvaticum*), Forasacco eretto (*Bromus erectus*), Ventolina dei boschi (*Bromus ramosus*), Melica comune (*Melica uniflora*), Gigaro (*Arum italicum*), Carice digitata (*Carex digitata*), Carice delle selve (*Carex sylvatica*), Elleborina gialla (*Cephalanthera damasonium*), Concordia (*Dactylorhiza fuchsii*).

**Funghi:** *Trametes versicolor*, *Xerocomus chrysenteron*, *Armillaria mellea*, *Marasmius scorodonius*, *Amanita ovoidea*, *Amanita pantherina*, *Amanita citrina*, *Coprinus micaceus*, *Coprinus picaceus*, *Lactarius* cfr. *serifluus* (CECCONI 1973); inoltre *Hirneola auricula-judae*, *Clitocybe gibba*, *Omphalotus olearius*, *Entoloma sinuatum*, *Amanita phalloides*, *Agaricus xanthodermus*, *Leucoagaricus leucothites*, *Coprinus comatus*, *Hypholoma fasciculare*, *Hebeloma crustuliniforme*, *Russula delica*, *Phallus impudicus*, *Clathrus ruber*.

#### **FAUNA:**

**Mammiferi:** Riccio, Talpa europea, Donnola, Faina, Tasso, Volpe.

**Uccelli:** tra i nidificanti, la Tortora, il Cuculo, il Torcicollo, il Rigogolo, lo Scricciolo, la Capinera, il Pettiroso, l'Usignolo, il Merlo, la Cinciallegra, il Codibugnolo, il Fringuello, il Verzellino, il Verdone, il Cardellino.

**Rettili:** Ramarro, Lucertola muraiola, Biacco, Colubro di Esculapio.

**Anfibi:** Rospo comune.

**IMPORTANZA BIOGEOGRAFICA:**

pur se modesto, è un bosco d'alto fusto a testimonianza dei boschi che un tempo ricoprivano anche le colline in vicinanza del mare.

Ospita diverse specie di piante relitte, localmente rare ma ordinariamente presenti a quote più elevate nel bacino del Metauro, quali *Anemone trifolia*, *Cardamine bulbifera*, *Sanicula europaea*, *Melittis melissophyllum*, *Lilium bulbiferum* subsp. *croceum*, *Dactylorhiza fuchsii*.

Il Bosco di Severini (detta localmente selva) è considerato dal Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche una emergenza botanico-vegetazionale di eccezionale valore (BA).

PRESENZA ANTROPICA: minima.

VIE DI COMUNICAZIONE LIMITROFE: strada comunale.

UTILIZZO DEL TERRITORIO: il bosco è recintato e non più soggetto ad alcuna utilizzazione.

FORME SPECIFICHE DI PROTEZIONE ESISTENTI: area floristica (L. Reg. Marche 52/1974).

Tutela integrale art. 85 N.T.A. del PRG del Comune di Fano.

PREVISIONI PAESISTICO-AMBIENTALI (P.P.A.R.): nessuna.

ALTRI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

BRILLI-CATTARINI 1977, POGGIANI 1986, BALLELLI e

PEDROTTI 1992, REGIONE MARCHE 1997

ANNO AGGIORNAMENTO: 2000